

Formulář pro hodnocení rizika vzniku dekubitů

Výsledný součet odpovídá hodnotám 5–20, uvedených v Zákoně č. 48/1997 Sb., příloha 3, oddíl C (Kategorizace zdravotnických prostředků hrazených na poukaz).

Pacient:

Somatický stav

Dobry 4 body	Obstojny 3 body	Špatny 2 body Například kachexie, adipositas.	Velmi špatny 1 bod Pacient je velmi ohrožen svým somatickým stavem.	Výsledek
-----------------	--------------------	--	--	----------

Duševní stav

Jasně vědomí 4 body	Apatický 3 body Nezúčastněný.	Zmatený 2 body Desorientovaný místem i časem.	Stupor až bezvědomí 1 bod	Výsledek
------------------------	-------------------------------------	---	------------------------------	----------

Aktivita

Chodící bez pomoci 4 body	Chodící s pomoci 3 body Potřeba částečné podpory.	Na invalidním vozíku 2 body Potřeba rozsáhlé podpory.	Ležící 1 bod Naprostá závislost na většině úkonů.	Výsledek
------------------------------	---	---	--	----------

Pohyblivost

Plná 4 body	Částečně omezená 3 body Mírná omezení v kloubech (ramenní, kyčelní, kolenní).	Velmi omezená 2 body Omezení hybnosti po operacích kloubů, kontraktury, rozsáhlé fixace.	Zcela omezená 1 bod Není schopen vykonávat samostatně žádné pohyby, nebo jen s velkými obtížemi.	Výsledek
----------------	--	--	--	----------

Inkontinence

Žádná 4 body	Občasná 3 body	Převážně moč 2 body	Moč i stolice 1 bod	Výsledek
-----------------	-------------------	------------------------	------------------------	----------

Výsledný součet:

Vyhodnocení - škála NORTON

20 - 16 bodů ☐



Nizké riziko vzniku dekubitů

Nizké riziko vzniku dekubitů nebo těžké obtíže při chůzi na krátké vzdálenosti a mobilita na vozíku.

07.06.01.01

MediSleep Basic



16 - 14 bodů ☐



Střední riziko vzniku dekubitů

Střední riziko vzniku dekubitů nebo funkční změny vedoucí k asymetrii pánve a těžká porucha hybnosti dolních končetin a mobilita na vozíku.

07.06.01.02

MediSleep I. MediSleep II.



MediNap

MediGo



14 - 12 bodů ☐



Vysoké riziko vzniku dekubitů

Vysoké riziko vzniku dekubitů nebo těžká až úplná ztráta (porucha) čítí v sedací oblasti - hýždě, zadní strana stehen; hráz nebo strukturální změny vedoucí k asymetrii pánve + těžká porucha hybnosti dolních končetin, mobilita na vozíku.

07.06.01.03

MediCare MediHelp



< 12 bodů ☐



Velmi vysoké riziko vzniku dekubitů

Velmi vysoké riziko vzniku dekubitů nebo imobilní pacienti s vysokým rizikem dekubitů s předpokladem dlouhodobého nebo trvalého užívání.

07.06.01.04

MediDream



Ošetřující lékař

Matrace jsou zdravotnické prostředky. Čtěte pečlivě návod k použití a informace k bezpečnému používání.

Při hodnocení používá indikující lékař následující postup: Vyberte vhodný popis pacienta (4, 3, 2 nebo 1 bod) v každém z pěti hodnocených parametrů a výsledek zaznamenejte do volného pole napravo, výsledek sečtěte a hodnocení přiložte k žádosti o posouzení Revizním lékařem pojišťovny (Žádanka o zvýšení úhrady), je-li vyžadováno. Výsledný součet pomáhá zařadit pacienta do jednotlivých rizikových skupin pro jednotlivé úhradové kategorie (UHS). Pokud to zdravotní stav pacienta vyžaduje, může být přihlédnuto ke klinickému posouzení ošetřujícím lékařem, včetně podrobnějšího zdůvodnění potřeby pomůcky.